AANVRAAG VOOR MOLECULAIRE MICROBIOLOGIE

LABORATORIUM VOOR KLINISCHE BIOLOGIE

Bloedafname
ingang 12 - R 1201 (0K12)
ingang 74 - R 734 (0B2)
8u tot 17u
09 332 22 19 (0K12)
Infectieuze serologie
09 332 36 35
Moleculaire microbiologie
09 332 07 36

ADREMA:

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Dienst:

Datum van aanvraag: ..... om ..... uur

Datum van afname: ..... om ..... uur

Aanvragende arts: .....

RIZIV Nr : .....

Handtekening: .....

Staal afgenomen door:.....

Kopie aan Dr. ..... Uw refnr.: .....

199 KLINISCHE INLICHTINGEN:

GENOOMDETECTIE RESPIRATOIRE PATHOGENEN

	BAL	NFS	NFA	SPUTUM
Influenza Urgent	$ ☐ 8541	$ ☐ 8542	$ ☐ 8543	
RSV Urgent	$ ☐ 8531	$ ☐ 8532	$ ☐ 8533	
Bacteriële respiratoire pathogenen	$ ☐ RESPBB4	$ ☐ RESPBB2	$ ☐ RESPBB3	
Virale respiratoire pathogenen	$ ☐ RESPVB4	$ ☐ RESPVB2	$ ☐ RESPVB3	
Bacteriële respiratoire pathogenen na orgaan Tx	☐ RESPBB1			
Virale respiratoire pathogenen na orgaan Tx	☐ RESPVB1			
Bordetella spp.	$ ☐ BORDPB4	$ ☐ BORDPB5	$ ☐ BORDPB6	
Bordetella spp. pediatrie*	☐ BORDPB1	☐ BORDPB2	☐ BORDPB3	
Pneumocystis jirovecii	$ ☐ PNJDNA			
Legionella pneumophila	$ ☐ RESPBLP			$ ☐ RESPBLP

☐ Andere: Specifieer SSTC=.....

GENOOMDETECTIE SEKSUEEL OVERDRAAGBARE INFECTIES

C. trachomatis	☐ Urethrale wisser CLURE ☐ Urine (1ste portie) CLURI	☐ Cervicale wisser CLCER ☐ Anale wisser CLANA	☐ Vaginale wisser CLVAG	☐ Keelwisser CLKEE
N. gonorrhoeae	☐ Urethrale wisser UREG ☐ Urine (1ste portie) URG	☐ Cervicale wisser CERG ☐ Anale wisser ANG	☐ Vaginale wisser VAGG	☐ Keelwisser KEEG
$ **Herpes simplex**	☐ Vocht HSVDNAP1	☐ Wisser HSVDNAP2		

Enterovirus RNA			
> Vermoeden van meningitis of meningoencephalitis	☐ LV MENTB1		(max. 1 x per episode)
> Acute pericarditis of myocarditis	☐ Biopt MENTB2		(max. 2 x per episode)
> Congenitale infectie	☐ Biopt MENTB3		(max. 1x)
$ > Andere	☐ Faeces ENTRNA		
Herpes simplex virus DNA			
> Meningitis / (meningo)encephalitis / myelitis	☐ LV MHSVB1		(max. 2 x per episode)
> Immuungecompromitteerde patiënt met tractuslaesie	☐ BAL MHSVB5	☐ Biopt MHSVB4	(max. 2 x per episode)
> Herpes neonatorum max. 1x	☐ Vocht MHSVB6	☐ Wisser MHSVB7	(max. 2 x per episode)
$ > Andere	☐ Vocht HSVDNAP1V	☐ Wisser HSVDNAP2W	(max. 1 x)
Varicella zoster virus DNA			
> Meningitis / (meningo)encephalitis / myelitis	☐ LV MVZVB1		(max. 2 x per episode)
$ > Buiten indicatie	☐ Vocht VZVDNAP1V	☐ Wisser VZVDNAP2W	
Toxoplasma gondii DNA			
> Cerebrale toxoplasma bij immuungecompromitteerde (Toxo IgG positief)	☐ LV TOXDNA1	☐ Biopt TOXDNA1	(max. 1 x per episode)
> Oculaire toxoplasmose (Toxo IgG positief)	☐ Biopt TOXDNA2	☐ Wisser TOXDNA2	(max. 1 x per episode)
> Congenitale toxoplasmose seroconversie moeder	☐ Amnionvocht TOXDNA3		(max. 1 x per episode)
> Mors in utero hydrocefalie, intracerebrale calcificatie	☐ Biopt TOXDNA4		(max. 1 x per episode)

Cytomegalovirus DNA

- ☐ EDTA, HIV of behandeling met immunosuppressiva* CMVDNAB1
- ☐ EDTA orgaantransplant CMVDNAB2 (max. 4,12 of 23x per jaar afhankelijk timing en profylaxe)*
- ☐ Urine CMVDNAB5 of Guthrie CMVDNAB3 bij de pasgeborene met vermoeden van congenitale CMV*

$ ☐ EDTA andere CMVDNAB7 | $ ☐ LV CMVDNAB6L | $ ☐ Urine andere CMVDNAB8
$ ☐ Oogvocht CMVDNAB6O | $ ☐ Biopt CMVDNAB4 | $ ☐ BAL CMVDNAB6B
$ ☐ Amniomvocht CMVDNAB6A

Epstein-Barr virus DNA

- ☐ EDTA orgaantransplant seronegatief EBVDNAB2 (1e jaar : max. 8x per jaar ; 2e/3e jaar: max. 4x per jaar)*
- $ ☐ EDTA andere EBVDNAB3
- $ ☐ Biopt EBVDNAB4
- $ ☐ BAL EBVDNAB5B
- $ ☐ LV EBVDNAB5L

BK-virus DNA

- ☐ EDTA niertransplant BKVPB1 (1e/2e jaar :max. 4x per jaar ; 3e jaar : max. 1x per jaar)*
- $ ☐ EDTA BKVPB2
- $ ☐ Urine BKV

Adenovirus DNA

- ☐ Serum levertransplant ADVDNAB2 (max. 5x per episode)*
- $ ☐ Serum ADVDNAB3
- $ ☐ Faeces ADVDNAB4

Hepatitis B DNA

> Start therapie *Voorbehouden aan artsen-specialisten gastro-enterologie*	☐ EDTA HBVDNA1	(1 jaar: max. 3 x per jaar, nadien: max. 1 x per jaar)
> Opvolging therapie *Voorbehouden aan artsen-specialisten gastro-enterologie*	☐ EDTA HBVDNA2	(max. 2 x per jaar)
> Heropflakkering chron HBV bij abnormale levertesten *Voorbehouden aan artsen-specialisten gastro-enterologie*	☐ EDTA HBVDNA3	(max. 2 x per jaar)

Hepatitis C RNA

> Kind van HCV-positieve moeder	☐ Serum HCVRNA1	☐ EDTA HCVRNA1
> Bevestiging van HCV-positieve serologie	☐ Serum HCVRNA2	☐ EDTA HCVRNA2
> Vermoeden van HCV bij immuungecompromitteerde of dialysepatiënt	☐ Serum HCVRNA3	☐ EDTA HCVRNA3
> Symptomen na prikaccident met HCV-positieve persoon	☐ Serum HCVRNA4	☐ EDTA HCVRNA4
> HCV kwantitatief tijdens therapie *Voorbehouden aan artsen-specialisten gastro-enterologie*	☐ Serum HCVRNAQ	☐ EDTA HCVRNAQ
> HCV genotypering bij start therapie *Voorbehouden aan artsen-specialisten gastro-enterologie*	☐ Serum HCVGEN	

$ **Hepatitis D RNA**	☐ Serum HDVRNA	☐ EDTA HDVRNA

GENOOMDETECTIE BIJ ALLO-HSCT

CMVDNA allo-HSCT Cum114	☐ EDTA CMVDNAB9
EBVDNA allo-HSCT Cum114	☐ EDTA EBVDNAB6
BKVP allo-HSCT Cum114	☐ EDTA BKVPB3
ADVDNA allo-HSCT Cum114	☐ EDTA ADVDNAB1

CUM114= RIZIV-terugbetaling binnen de 4 maand na allo-HSCT
(max; 80x samen CMVDNA, EBVDNA, ADVDNA en BKVP)

* Zie labgids voor RIZIV-regels

$: Niet vergoed door RIZIV