

AANVRAAGFORMULIER

Opsporen heparine – geïnduceerde plaatjesantilichamen

ELISA + functionele flowcytometrische assay

AANVRAGENDE AFDELING :

GEGEVENS VAN DE PATIËNT

Naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en UZ-nummer

GEGEVENS VAN DE AANVRAGENDE ARTS

Naam, voornaam, Riziv-nummer en stempel

KLINISCHE INLICHTINGEN

IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGENDE ARTS

Type heparine : -----

Reden heparinisatie: -----

Aantal trombocyten: -----

Warkentin 4T score ⁽¹⁾: -----

(1) GELIEVE IN ONDERSTAANDE TABEL PER "T" DE JUISTE CONDITIE TE OMCIRKELEN

AANTAL PUNTEN	2	1	0
Trombocytopenie	>50% trombocytendaling met laagste aantal $\geq 20 \times 10^3 / \mu\text{L}$	30-50% trombocytendaling of laagste aantal $10-19 \times 10^3 / \mu\text{L}$	<30% trombocytendaling of laagste aantal $\leq 10 \times 10^3 / \mu\text{L}$
Tijdstip van trombocytendaling Dag 0 = eerste dag van meest recente heparine blootstelling	Begin dag 5-10 of \leq dag 1 met recent heparine gebruik (voorafgaande 5-30 dagen)	Begin na dag 10, of begin onduidelijk of \leq dag 1 met recent heparine gebruik (voorafgaande 31-100 dagen)	Begin \leq dag 4 zonder recent heparine gebruik
Trombose of andere sequelae	Nieuwe trombose, huidnecrose of acute systemische reactie na heparinebolus	Progressieve of recidief trombose, erythemateuze huidafwijkingen, verdenking trombose – niet bevestigd	Geen
Andere oorzaak van trombocytopenie	Geen andere oorzaak voor trombocytendaling	Andere oorzaak voor trombocytendaling mogelijk	Andere oorzaak voor trombocytendaling zeker

Hoog risico: score 6-8, intermediair risico: score 4-5, laag risico: score 0-3