

AANVRAAG BIJZONDERE STOLLING



LABORATORIUM VOOR
KLINISCHE BIOLOGIE
Bloedafname

ingang 12 - R 1228 (0K12)

ingang 74 - R 734 (0B2)

8u tot 17u

09 332 22 19 (0K12)

Laboratorium

09 332 34 34

ADREMA:

Patiënt: (naam, voornaam, adres, geboortedatum, geslacht)

Dienst:

Datum van aanvraag: om uur

Datum van afname: om uur

Aanvragende arts:

RIZIV Nr :

Handtekening:

Staal afgenomen door:.....

Kopie aan Dr. Uw refrn:

KLINISCHE INLICHTINGEN VERPLICHT IN TE VULLEN

Medicatie (Anticoagulantia of antiaggregantia):

STOLLING

2 citraatbuizen van 2,7 ml tenzij anders vermeld

Bij (neiging tot) bloeding

- 1102 ☐ Protrombine F II
1105 ☐ Proaccelerine F V
1107 ☐ Proconvertine F VII
1110 ☐ Stuart Factor F X

1108 ☐ F VIII: C stolactiviteit

- 1124 ☐ vWF: Ag
1125 ☐ vWF: activiteit

- 1109 ☐ F IX activiteit
1111 ☐ F XI activiteit
1112 ☐ F XII activiteit
1113 ☐ F XIII activiteit

- 1118 ☐ anti-F VIII antilichamen
1119 ☐ anti-F IX antilichamen

- 1130 ☐ Plaatjesaggregatie 5 EXTRA CITRAATBUIZEN VAN 2,7 ML vóór 14 uur in lab
PFA ☐ Plaatjesfunctie screening (PFA) 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML (D 84)

Diagnoseregels

De aanvrager van deze analyses verklaart dat

- D20: Aanrekenbaar aan RIZIV indien patiënt < 55 jaar met een trombotisch proces, indien patiënt met een familiale anamnese van recidiverende trombosen of in geval van diffuse intravasale stolling
- D84: Aanrekenbaar aan RIZIV in het kader van een oppuntstelling van een ernstige bloedingsdiathese met een normaal aantal bloedplaatjes
- D106: In geval van aanwezigheid klinische criteria antifosfolipidensyndroom (vasculaire trombose en/of miskraam) of systemische lupus erythematoses
- D107: De verstrekking 553313-553324 mag alleen worden aangerekend in geval van een behandeling met heparine of factor Xa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende trombosen onder behandeling, bij patiënten onder ECMO (extracorporele membraanoxygenatie), bij patiënten in peri-operatorie periode of in geval van behandeling met een antidotum
- D163: De verstrekking 552451-552462 mag enkel worden aangerekend in geval van een behandeling met factor IIa-inhibitoren in de volgende omstandigheden: bij een zwangere vrouw, een kind van minder dan 18 jaar, een patiënt met nierinsufficiëntie, een patiënt met BMI hoger dan 30 of lager dan 18, bij hemorragische diathese, bij terugkerende trombosen onder behandeling, bij patiënten in peri-operatorie periode of in geval van behandeling met een antidotum

Bij (neiging tot) trombose

- 116 ☐ Antitrombine activiteit (D 20)
1122 ☐ Proteïne C activiteit (D 20)
1123 ☐ Proteïne S antigen - vrije fractie (D 20)
115 ☐ APC resistentie (D 20)
1151 ☐ FV Leiden (ENKEL INDIEN APC RESISTENTIE POSITIEF IS)
1152 ☐ FII G20210A mutatie (D 20)
1108 ☐ F VIII: stolactiviteit
1126 ☐ Lupus anticoagulans 2 EXTRA CITRAATBUIZEN VAN 2,7ML (D 106)
APA ☐ Antifosfolipiden antistoffen 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML (D 106) - anticardiolipine antistoffen
1173 ☐ β2 glycoproteïne antistoffen

Varia

- 1132 ☐ Plaatjesantilichamen geïnduceerd door heparine: klinische inlichtingen in te vullen (4T score) op apart formulier (zie intranet) 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML
1114 ☐ anti-Xa 1 uur vóór inspuiting van LMW heparine (D 107) Gebruikt LMWH:
1115 ☐ anti-Xa 4 uur na inspuiting van LMW heparine (D 107) Gebruikt LMWH:
1116 ☐ anti-Xa niet - gefractioneerde heparine (D 107) Gebruikt UFH:
1153 ☐ Monitoring dabigatran 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML (D 163)
1155 ☐ Monitoring rivaroxaban 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7 ML (D 107)
APIX ☐ Monitoring apixaban 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML (D 107)
EDOX ☐ Monitoring edoxaban 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML (D 107)
ROTEM ☐ ROTEM intem-extem-fibtem-apterm (routine) 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7ML
ROTEMHEP ☐ ROTEM intem-extem-fibtem-heptem (bij heparine gebruik) 1 EXTRA CITRAATBUIS VAN 2,7 ML

Andere te specificeren: (na 09 332 21 53)

.....